



Impfkalender für Babys und Kinder bis zwei Jahre

Im Impfkalender ist aufgeführt, welche Standardimpfungen 2020 in welchem Alter empfohlen werden.

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten								
		2	3	4	5-10	11	12	13-14	15	16-23
Tetanus	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Diphtherie	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Keuchhusten	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
<i>Haemophilus influenzae</i> Typ b	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Kinderlähmung	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Hepatitis B	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Pneumokokken	–	G1	N	G2	N	G3 ^{b)}			N	
Rotaviren	G1 ^{a)}		G2	(G3)	–					
Meningokokken C	–						G1		N	
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	–					G1	N		G2	N
Windpocken	–					G1	N		G2	N

Erläuterungen

Buchstabe	Info
G	Grundimmunisierung (in bis zu drei Teilimpfungen G1-G3)
N	Nachholimpfung möglich
a)	Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
b)	Die vorangegangene Impfdosis sollte mindestens 6 Wochen zuvor verabreicht worden sein.

Besonderheiten für Frühgeborene

Frühgeborene sollten bei bestimmten Standardimpfungen eine zusätzliche Impfdosis erhalten, wenn die Babys drei Monate alt sind. Dies gilt für Impfungen gegen

- Tetanus,
- Diphtherie,
- Keuchhusten,
- Kinderlähmung,
- *Haemophilus influenzae* Typ b (HiB),
- Hepatitis B sowie
- Pneumokokken.



Eigene Notizen
